

Hyrimoz sensoready injectie 40 mg in pen

Werking

■ Het werkzame middel

Het werkzame middel in dit medicijn is **adalimumab**. In elke injectie van 0,8 ml zit 40 mg adalimumab.

■ Waar het medicijn voor is

Ontstekings-ziekten waarbij de afweer werkt tegen het eigen lichaam (auto-immuunziekten). Zoals:

- Verschillende vormen van reuma (gewrichts-ontstekingen)
- Huidziekte met een te snel schilferende huid (psoriasis). Soms met ontstekingen van gewrichten.
- Ziektes met een heel erge ontsteking van de darm die vaak terugkomt (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)
- Een huidziekte met ontstekingen in huidplooien, zoals oksels en liezen.
- Een ontsteking in het oog.

Wilt u meer weten over ziekte en gezondheid? Vraag dan advies aan uw arts of apotheker. Of kijk op www.thuisarts.nl.

■ Hoe dit medicijn werkt

Het remt ontstekingen. Hierdoor komt de ziekte tot rust en nemen klachten af. Bij reuma en gewrichts-psoriasis remt het ook het achteruitgaan van de gewrichten.

■ Wanneer het begint te werken

De werking begint na enkele dagen. De klachten verbeteren na enkele weken tot maanden.

Voor u dit medicijn gaat gebruiken

■ Gebruik met uw andere medicijnen

Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere middelen. Geef daarom altijd aan uw arts en apotheek door welke middelen u gebruikt. Zoals medicijnen die u zelf koopt. Denk ook aan vitamines, voedings-supplementen en kruidenmiddelen. De apotheek controleert dan of u ze samen kunt gebruiken.

■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten

Niet gebruiken bij

Een infectie. Overleg dan met de arts. De behandeling mag pas starten als de infectie onder controle is.

Voor vrouwen geldt:

Neem tijdens en tot 5 maanden na de behandeling maatregelen om een zwangerschap te voorkomen. Het is namelijk niet bekend welke gevaren er zijn voor het ongeboren kind. De arts zal de meest geschikte voorbehoedsmiddelen met u bespreken. Wordt u toch zwanger? Neem dan meteen contact op met de arts.

Let op bij

- een infectie met het hepatitis B-virus (ook in het verleden)
- kanker (ook in het verleden)
- multiple sclerose (MS), een ziekte waarbij de zenuwen zijn beschadigd.

Overleg hierover met de apotheker of arts.

■ Gebruik bij zwangerschap

Wilt u zwanger worden of bent u al zwanger? Overleg dan met de arts of u dit middel kunt gebruiken.

Bij gebruik in de laatste 6 maanden van de zwangerschap kan de eigen afweer van de baby verminderd zijn. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als de baby een vaccin nodig heeft. De arts doet hier na de geboorte extra controles voor.

Zie ook het advies in 'gebruik bij andere ziekten of klachten'.

■ Gebruik bij borstvoeding

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft. Maar gebruik het alleen na overleg met de arts of apotheker.

Het gebruik van dit medicijn

■ Hoe gebruiken

Wordt ingespoten onder de huid, meestal in de buik of het bovenbeen.

Bij zelf inspuiten

Volg de aanwijzingen die de arts of verpleegkundige heeft gegeven. Lees de bijsluiters voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing. In het algemeen geldt:

1. Leg alles klaar wat nodig is.
2. Controleer of de vloeistof eruit ziet zoals hoort. Niet schudden.
3. Zorg dat het medicijn op kamertemperatuur is.
4. Was de handen.
5. Maak de spuit volgens de aanwijzingen klaar.
6. Kies iedere keer een andere prikplek.
7. Maak de huid op de prikplek schoon met een alcoholdoekje.
8. Spuit volgens de aanwijzingen van de arts of verpleegkundige.
9. Druk de prikplek even dicht met een gaasje.
10. Doe de spuit in een af te sluiten afvalcontainer.

■ Gebruikelijke doseringen

Soms wordt eerst een opstart-schema gebruikt.

Volg altijd het schema dat de arts voor u heeft opgesteld.

Meestal 1 maal per 2 weken inspuiten. Soms 1 maal per week.

■ Hoelang gebruiken

Bij een goed effect gebruikt u dit medicijn meestal een lange tijd. Dit is nodig om terugkomen van de klachten te voorkomen. Blijf dit middel daarom gebruiken volgens de uitleg van de arts.

■ Bij een vergeten dosering

Het advies hangt af van het tijdstip dat u er achter komt:

- Is het nog niet de dag waarop u de volgende injectie moet toedienen? Gebruik de vergeten dosering alsnog.
- Is het al de dag waarop u de volgende injectie moet toedienen? Sla dan de vergeten dosering over.

Bijwerkingen

Hier staan de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

Dit middel vermindert de eigen afweer van het lichaam. Daardoor is er meer kans op infecties. Probeer infecties zoveel mogelijk te voorkomen. De arts of verpleegkundige kan hierover advies geven.

Op de prikplek kan een rode kleur, jeuk, bloeding, pijn en zwelling ontstaan.

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de apotheker of arts.

Er kan een tekort aan bloedcellen ontstaan. Dit is te merken aan:

- koorts, keelpijn of blaasjes in de mond

- snel moe zijn, bleek zien, moeite met ademen of duizelig voelen
- blauwe plekken, rode puntjes op de huid, bloedingen zoals een bloedneus of wondjes die lang blijven bloeden.

Waarschuw dan de arts.

Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- klachten die horen bij een infectie. Bijvoorbeeld koorts, niet lekker voelen, hoesten, benauwd zijn, keelpijn, verkouden zijn en griepachtige klachten. Of pijn bij het plassen, een koortslip of huiduitslag.
- zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting. Dit kan wijzen op bloedverlies uit de maag of darm.

Waarschuw dan meteen de arts.

Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

- misselijk zijn, overgeven, buikpijn
- hoofdpijn, migraine, duizelig voelen
- huiduitslag, jeuk, galbulten
- een tintelend, prikkelend of doof gevoel
- pijn onderin de rug die uitstraalt naar het been
- hoest, benauwd zijn, spierpijn, spierkrampen
- ontsteking van het oog, minder goed kunnen zien
- droge ogen of droge mond
- te snelle hartslag of pijn op de borst.
- depressie, angst, niet kunnen slapen
- blozen, zweten, breken van nagels
- allergische reacties, zoals hooikoorts
- uitdrogen. Dit is te merken aan een droge mond, droge huid. En aan weinig of niet kunnen plassen en een donkere kleur urine.

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de apotheker of arts.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

- veel pijn in de bovenbuik met misselijk zijn en een opgeblazen gevoel
- erger worden van hoest en benauwd zijn of plotseling moeilijk kunnen ademen en koorts. Dit kan wijzen op een longziekte.
- spierpijn die niet overgaat, met spierkramp of zwak gevoel in spieren. Soms met cola-kleurige urine, koorts en gevoel van ziek zijn.
- drukkende pijn op de borst. Dit kan uitstralen naar de kaak, armen, rug of maag. Meestal met misselijk zijn en zweten. Dit kan wijzen op een hartaanval.

Waarschuw dan meteen de arts.

Ook kunnen zelden voorkomen:

- problemen met horen
- seksuele problemen, namelijk een penis die minder stijf wordt

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de apotheker of arts.

Na lang gebruik

Dit middel verhoogt de kans op huid-kanker en lymfeklier-kanker. De arts of verpleegkundige kan u hier adviezen over geven. Merkt u een van de volgende klachten:

- huidveranderingen. Bijvoorbeeld het ontstaan van een huidknobbeltje of wratten. Of moedervlekken die veranderen van kleur of grootte en gaan jeuken of bloeden
 - ongewone knobbels in de oksels, liezen of hals
- Waarschuw dan de arts.

Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts.

Meld ervaringen met bijwerkingen op www.mijnbijwerking.nl. Dit kan helpen informatie over medicijnen te verbeteren.

Kenmerken van dit medicijn

injectie

Bij vragen, of voor meer informatie

Overleg met de apotheker of arts bij vragen over het gebruik van dit medicijn.

Over deze medicijn-informatie

Deze informatie is een selectie uit wat bekend is over dit medicijn. Het bevat dus niet alle mogelijke waarschuwingen en bijwerkingen. Het komt ook niet in de plaats van de bijsluiter van de fabrikant of aanwijzingen van de arts. Overleg bij vragen met uw apotheker of arts.

Laatste wijziging in deze informatie: 20 augustus 2024.

© Stichting Health Base

ZGT ziekenhuis

Zilvermeeuw 1 - | 7609 PP - Almelo

Tel. 088-7087878

info@zgt.nl

www.zgt.nl

Informatie van de apotheek

Heeft u nog vragen over dit geneesmiddel? Vraag naar de ZGT Apotheek via de verpleging.